

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP -2-4-68 767735

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 16, rue de la République - MONTPELLIER

C.C.P. : MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 francs

N° 90 - MARS 1968/7

2° supplément

## POMMIER

Les premiers traitements dirigés contre l'Oïdium doivent être appliqués dès maintenant (la majorité des arbres ont dépassé le stade B). Les éclosions de pucerons ont commencé. Dans les vergers qui n'ont pas reçu de traitement aux huiles jaunes ou aux colorants nitrés, il sera nécessaire d'effectuer une pulvérisation à base d'oléoparathion en ayant soin de bien mouiller.

Si une application de soufre est prévue, placer ce traitement quelques jours après.

Dans le cas où la culture a reçu un traitement d'hiver on aura recours à un aphicide H.C.H., Lindane, etc.

Les vergers de montagne (vallée de l'Orb et du Jaur, Cévennes) ont souffert d'attaques d'Anthonomes. Pour atteindre efficacement ce parasite il faut traiter par temps chaud et ensoleillé; l'H.C.H. et le Lindane sont aussi efficaces contre ce coléoptère.

Dans ces mêmes secteurs, les prochaines pluies provoqueront des contaminations certaines de Tavelure. On ajoutera donc à la bouillie un fongicide.

## POIRIER

Dans les vergers où les Psylles et la Tavelure sont à redouter, appliquer des produits efficaces contre ces parasites.

Dans les régions où les maladies bactériennes existent : noircissement des pousses, on appliquera un traitement cuprique.

## CERISIER

Il est nécessaire d'exécuter un traitement préfloral des cerisiers. Ce traitement sera anticryptogamique (utiliser une spécialité à base de cuivre) pour prévenir le Coryneum, le Gnomonia, le Monilia et les maladies bactériennes.

Sur les arbres où la présence de Teigne des fleurs du cerisier a été précédemment observée, utiliser une bouillie mixte.

## PECHER

De nouvelles contaminations de Cloque étant possibles, le renouvellement de protection sera fait avec un anticryptogamique de synthèse.

## PRUNIER

La floraison du prunier est en cours. A la chute des pétales il est nécessaire de traiter contre l'Hoplocampe. Une bouillie mixte sera alors utile pour lutter contre le Monilia et la Cloque.

L.L.TROUILLON - M. BEZUT

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Tirage du 22 Mars 1968

P295

TEIGNE DE L'OLIVIER

Des chenilles très actives ont été observées dans le département du Gard ( région de Vauvert - St-Gilles - St Gervasy). Ce sont des chenilles mineuses du feuillage (génération phyllophage). Il est nécessaire d'arrêter leur développement par un traitement insecticide exécuté dès réception du présent avis. L'élimination des larves actuellement mineuses, réduira ou supprimera la génération autophage qui vit au dépens des jeunes boutons floraux.

Utiliser l'arséniate de plomb, le D.D.T., l'H.C.H., le Déméton, le Dimethoate, le Diazinon.

Dans les olivettes où le Cycloconium s'est précédemment manifesté l'adjonction d'un anticryptogamique compatible est recommandé.

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles,

L.L.TROUILLON